

التقيؤ

تتعدد أسباب التقيؤ وتشمل كل ما يؤدي إلى تهيج غشاء المعدة أو الاثني عشر وأكثرها شيوعا : الالتهابات الفيروسية والحمل والتهابات الأذن لدى الاطفال ، إلتهاب عصب التوازن ، التسمم بالطعام الفاسد وتناول بعض الأدوية المؤذية لغشاء المعدة ...



وتجدر الاشارة إلى أن الأطفال الرضّع كثيرو التقيؤ والاستفراغ لأن جهازهم الهضمي حساس جدا وجهازهم العصبي غير مكتمل. ومعظم حالات التقيؤ والاستفراغ في هذا العمر لا تثير القلق خاصة إذا كان الطفل ينمو بشكل طبيعي ويتمتع بصحة جيدة ونشاط عادي

ما هي الاجراءات المناسبة لعلاج حالات التقيؤ والاستفراغ ؟ الأطفال :

الصبر والمثابرة مطلوبان. بعد نوبة الاستفراغ بإمكان الأم تجربة إعطاء الطفل كمية قليلة من الماء (ربع كوب تقريبا) أو مصل الشرب عند الحاجة فإذا تقبلها، ثابتت على تكرار المحاولة كل نصف ساعة تقريبا. أما إذا لم يتقبلها، فعلى الأم الصبر لمدة ساعة تقريبا ثم تكرار المحاولة في الحالات القصوى بالامكان إستخدام بعض الأدوية المضادة للقيء بعد الاتصال بالطبيب

مستشفى أبوجود / ٢٠١٩ / تعليم المريض